


PICC

INFORMACE PRO PACIENTY



CO JE TO PICC KATÉTR?

PICC (periferně inzerovaný centrální katétr) je dlouhodobý centrální žilní katétr, zavedený z paže do horní duté žíly.



Obr. 1: Vstup a uložení katétru PICC

JAKÉ JSOU NEJČASTĚJŠÍ DŮVODY PRO ZAVEDENÍ PICC KATÉTRU?

- nedostatečný žilní přístup
- potřeba centrálního katétru pro bezpečnou aplikaci chemoterapie
- aplikace léčiv a infuzních roztoků
- aplikace výživy

JAK SE ZAVÁDÍ PICC KATÉTR?


- Zavedení katétru provádí lékař ambulantně na zákrokovém sále.
- **Kuřáci se musí před výkonem 3 hodiny zdržet kouření!**
- Před zavedením PICC katétru můžete jíst a dostatečně pít.
- Před zavedením PICC katétru bude místo vpichu znecitlivěno.
- Po zavedení PICC katétru lékař provede kontrolu správné polohy katétru a je možné začít PICC ihned používat.

JAK JE PICC KATÉTR FIXOVÁN?

PICC katétr může být fixován pomocí speciální fixační podložky „StatLock“ (obr. 2) nebo fixační pomůckou „SecurAcath“ (obr. 3).



Obr. 2: Fixační podložka „StatLock“



Obr. 3: Fixační pomůcka „SecurAcath“

Výstup katétru z kůže je chráněn před infekcí průhledným sterilním krytím.

KDO PROVÁDÍ PŘEVAZ PICC?

Převaz mohou provádět výhradně vyškolené sestry nebo osoba blízká, kterou sestry naučí, jak správně postupovat. K převazu jsou obvykle také kompetentní sestry domácí péče. Převaz sestrou z domácí péče je nutné předem dohodnout s praktickým lékařem.

JAKÉ JE NEJZÁVAŽNĚJŠÍ RIZIKO PŘI POUŽÍVÁNÍ PICC KATÉTRU?

Největším rizikem pro pacienta je infekční komplikace, která se projevuje zarudnutím místa vpichu nebo teplotou, třesavkou již krátce po aplikaci do PICC katétru nebo po proplachu. Při této komplikaci neprodleně informujte svého ošetřujícího lékaře!

JAKÉ JSOU DALŠÍ NEŽÁDOUCÍ PŘÍZNAKY, KTERÉ MUSÍTE HLÁSIT?

- **sekrece, prosakování** v okolí výstupu katétru
- **svědění a vyrážka** pod krytím PICC
- **bolest nebo otok paže** (ramene, krku)

JAK PEČOVAT O ZAVEDENÝ PICC?

- **1× týdně je nutné PICC převázat a propláchnout** = prevence infekce a průchodnosti katétru.
- Chraňte PICC před promáčením a odlepením krytí při sprchování.
- Sledujte případný výskyt nežádoucích příznaků a hlasejte je sestřám nebo ošetřujícímu lékaři.

UPOZORNĚNÍ

Chraňte oblast zavedeného PICC před nárazem! Fyzickou a sportovní aktivitu vždy konzultujte s ošetřujícím lékařem.

V PŘÍPADĚ KOMPLIKACÍ KONTAKTUJTE, PROSÍM, SVÉHO OŠETŘJÍCÍHO LÉKAŘE!

Mimo ordinační dobu (v odpolední a noční hodiny, SO-NE, svátky) se obraťte na:

☎ 543 131 111 – ústředna MOÚ

☎ 606 729 717 – KKOP služba, lékař

PRŮKAZ NOSITELE PICC

Bude Vám vydán po zavedení katétru. Tento dokument noste ke každé návštěvě zdravotnického zařízení. Průkaz obsahuje důležité informace.

MO
U Masarykův
onkologický
ústav

Žlutý kopec 7, 656 53 Brno

**PICC
KATÉTR**
PRŮKAZ
NOSITELE

Identifikační štítek
pacienta s číslem
průkazu

Datum zavedení provedl lékař(ka)

Poučení pacienta po zavedení PICC dne provedl(a)

Lokalizace (cílová céva):

- pravá horní končetina
- levá horní končetina
- v. brachialis
- v. basilica
- v. cephalica
- jiná céva

IMPLANTÁT:

lot.		
kompatibilní s MR	ANO	NE
aplikace kontrastu CT	ANO	NE
síla katétru	Fr	
materiál:	SILIKON	POLYURETAN
fixace:	SECURACATH	JINÁ

Kontrola systému po zavedení provedena dne

provedla lékař(ka)

Extrakce stehů provedena dne provedl(a)

Obr. 4: Průkaz nositele PICC katétru



Informační a edukační centrum MOÚ
Autor: Eva Vykoukalová, Iveta Floriánová

CV5/2026/1

Masarykův onkologický ústav
Žlutý kopec 7, 656 53 Brno

 www.mou.cz
 543 131 111

Tyto materiály jsou určeny výhradně pro potřebu MOÚ v Brně a jsou chráněny zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). Rozmnožování, rozšiřování či jiné užívání těchto materiálů bez písemného souhlasu Masarykova onkologického ústavu je nepřipustné. © 2026