













## 5. Zápis v dokumentaci

### Vyhláška č. 279/2020 Sb.

Zdravotnická dokumentace v návaznosti na zjištěné informace o zdravotním stavu pacienta dále obsahuje záznam o použití omezovacích prostředků vůči pacientovi, který obsahuje:

1. záznam o indikaci omezení včetně specifikace druhu, důvodu a účelu omezení a stanovení intervalů kontrol a jejich rozsahu; z uvedení důvodu též musí vyplývat, proč nepostačovalo použít mírnější postup, než je použití omezovacích prostředků,
2. čas zahájení a ukončení použití omezovacího prostředku,
3. záznamy o průběžném hodnocení trvání důvodů použití omezovacího prostředku,
4. záznamy o průběžném hodnocení zdravotního stavu pacienta v průběhu omezení,
5. v případě výskytu komplikací jejich popis a způsob řešení,
6. jméno, popřípadě jména, a příjmení zdravotnického pracovníka, který použití omezovacího prostředku indikoval; v případě, že použití omezovacího prostředku neindikoval lékař, také jméno, popřípadě jména, a příjmení lékaře, který byl o použití omezovacího prostředku dodatečně informován,
7. v případě, že použití omezovacího prostředku neindikoval lékař, záznam lékaře o vyhodnocení odůvodněnosti omezení, včetně času, kdy ji potvrdil,
8. informaci o tom, že byl a kdy byl zákonný zástupce pacienta, popřípadě jiná osoba, které podle zákona o zdravotních službách náleží práva a povinnosti zákonného zástupce, nebo opatrovník pacienta informován o použití omezovacích prostředků,

### Literatura

<https://postupy-pece.psychiatrie.cz/lecba/omezovaci-prostredky>

Franková V. delirium ve vyšším věku. Psychiatr.pro Praxi 2007; 2:56 – 59.

Pavlovský P. Akutní psychotické poruchy, diagnostika a léčba. Psychiatr. pro Praxi. 2013; 14(2):54 – 57.


Raboch J, Pavlovský P. Klinická psychiatrie v denní praxi. Praha, Galén 2008; 158 s.

Ressner P, Konrád J, Bártová P. Delirium u geriatrických nemocných. Neurol. Praxi 2011;12(5):311 – 316.

Seifertová D, Praško J, Hoschl C. Postupy v léčbě psychických poruch. Academia Medica. Pragensis 2004;479s.

Sláma O. Péče o umírajícího pacienta in. Sláma O, Kabelka L, Vorlíček J. Paliativní medicína pro praxi, Praha, Galén. 2007;301-311.

## 6. Rychlá orientace







## NEKLID OHROŽUJE SEBE A OSTATNÍ, NIČÍ MAJETEK



Selhala mírnější opatření (verbální zklidnění, p.o. medikace). Vyloučeny odstranitelné příčiny (žízeň, bolest, stres).



Vyšetření lékařem, indikace



Použití omezovacího prostředku



1. Omezení pohybu (kurty, fixační pásy)
2. Terapeutická izolace
3. Podání medikace bez souhlasu



Dostatečný počet školeného ZP, klidné jednání, nebolestivé, důstojnost pacienta

## POUŽITÍ OMEZOVACÍHO PROSTŘEDKU



Povinnost  
lékaře

Povinnost  
ošetřujícího  
týmu

Edukace nemocného,  
smysl opatření

Každé 3 hodiny kontrola  
nemocného, max. délka  
nepřetržitého omezení  
ochrannými pásy je  
6 hodin, poté musí lékař  
znovu rozhodnout o  
jeho ukončení či  
prodloužení.

Dokumentace

Sledovat a 30 minut stav  
vědomí, krevní tlak a pulz,  
prokrvení končetin, příjem  
tekutin, stravy, světelný a  
tepelný komfort, hygienu.  
Komunikovat. Zaznamenávat  
změny stavu pacienta a hlásit  
je lékaři. Vést dokumentaci.

Ukončení omezení ihned po  
odeznění důvodu jeho použití.