

indikátor	DG	stádium				Celkem 2015 - 2023	Komentář
		I	II	III	IV		
3 leté přežití podle diagnóz a stádií onemocnění	ZN prostaty (C61)	89.6 (88.0; 91.2)	93.7 (91.9; 95.5)	91.6 (88.5; 94.7)	64.5 (60.4; 68.9)	86.1 (84.9; 87.3)	Uvedeno je celkové přežití od dne stanovení diagnózy ZN u všech pacientů diagnostikovaných nebo léčených v MOÚ bez ohledu na formu protinádorové léčby. Pro odhad přežití byla použita metoda dle Kaplan-Meiera na kompletním souboru pacientů diagnostikovaných v období 2015 až 2022. Všechny hodnoty jsou doplněny 95% intervalem spolehlivosti.
	ZN ledviny (C64)	85.3 (82.1; 88.6)	84.6 (76.5; 93.6)	76.7 (70.6; 83.4)	18.8 (14.5; 24.4)	65.1 (62.3; 68.0)	
	ZN močového měchýře (C67)	69.3 (63.0; 76.2)	51.2 (43.4; 60.5)	43.3 (33.6; 55.9)	13.6 (8.8; 21.2)	47.4 (43.6; 51.5)	
	ZN varlete (C62)	98.7 (97.2; 100.0)	98.3 (95.1; 100.0)	70.8 (60.0; 83.4)	stadium IV není definováno	94.1 (91.9; 96.3)	
5 leté přežití podle diagnóz a stádií onemocnění	ZN prostaty (C61)	79.2 (76.7; 81.9)	83.7 (80.3; 87.2)	80.3 (75.0; 86.0)	52.8 (48.1; 58.0)	74.8 (73.0; 76.6)	Uvedeno je celkové přežití od dne stanovení diagnózy ZN u všech pacientů diagnostikovaných nebo léčených v MOÚ bez ohledu na formu protinádorové léčby. Pro odhad přežití byla použita metoda dle Kaplan-Meiera na kompletním souboru pacientů diagnostikovaných v období 2015 až 2022. Všechny hodnoty jsou doplněny 95% intervalem spolehlivosti.
	ZN ledviny (C64)	76.3 (72.1; 80.9)	72.8 (61.6; 86.0)	64.0 (56.5; 72.5)	10.2 (6.7; 15.4)	54.8 (51.6; 58.1)	
	ZN močového měchýře (C67)	51.4 (43.8; 60.2)	30.3 (22.7; 40.5)	26.3 (15.5; 44.8)	8.3 (4.4; 15.5)	31.0 (27.0; 35.5)	
	ZN varlete (C62)	98.1 (96.3; 100.0)	98.3 (95.1; 100.0)	68.0 (56.7; 81.6)	stadium IV není definováno	93.4 (91.0; 95.8)	

indikátor	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Celkem 2015 - 2023	Komentář
Podíl dosažených optimálních cytoredukci (R0) z celkového počtu operovaných	87,8%	87%	93,7%	86,6%	77,8%	82,7%	81,7%	80,3%	77,7%	83,9%	Uvedena je procentuální hodnota podílu resekovaných nádorů s výslednou R0 klasifikací dle hodnocení patologem. Hodnoty jsou vypočítány ze souboru nádorů s histopatologicky potvrzenou diagnózou zhoubného novotvaru urologické lokalizace.